

## Vacunas escolares requeridas y recomendadas en Indiana 2022 al 2023

Grado	Requisito		Recomendación
<b>Preescolar</b>	3 Hepatitis B 4 DTaP (difteria, tétanos y tos ferina) 3 Polio	1 Varicela 1 MMR (sarampión, paperas y rubéola) 2 Hepatitis A	Influenza anual
<b>De preescolar al quinto grado</b>	3 Hepatitis B 5 DTaP 4 Polio	2 Varicela 2 MMR 2 Hepatitis A	Influenza anual COVID-19
<b>De sexto al onceavo grado</b>	3 Hepatitis B 5 DTaP 4 Polio 2 Varicela	2 MMR 2 Hepatitis A 1 MCV4 (meningocócica) 1 Tdap (tétanos, difteria y Tos ferina)	Influenza anual 2/3 VPH (humano virus del papiloma) COVID-19
<b>Doceavo grado</b>	3 Hepatitis B 5 DTaP 4 Polio 2 Varicela	2 MMR 2 Hepatitis A 2 MCV4 1 Tdap	Influenza anual 2/3 VPH 2 MenB (meningocócica) COVID-19

**Hepatitis B:** La edad mínima para la tercera dosis de Hepatitis B es de 24 semanas de edad.

**DTaP:** 4 dosis de DTaP, DTP y DT son aceptables si la cuarta dosis se administró en o después del cuarto cumpleaños del niño.

**Polio \*:** 3 dosis de Polio son aceptables para todos los grados si la 3ª dosis se administró al cumplir los 4 años o después y al menos 6 meses después de la dosis anterior.

\* Para los estudiantes en los grados preescolar al decimo, la dosis final debe administrarse al cumplir los 4 años o después y debe administrarse al menos 6 meses después de la dosis anterior.

**Varicela:** la documentación del médico sobre el historial de la enfermedad, incluido el mes y el año, es una prueba de inmunidad para los niños que ingresan desde preescolar hasta el grado 12. El informe de los padres sobre el historial de enfermedades no es aceptable.

**Tdap:** No hay un intervalo mínimo desde la última dosis de Td.

**MCV4:** las personas que reciben la primer dosis al cumplir los 16 años o después solo necesitan 1 dosis de MCV4.

**Hepatitis A:** el intervalo mínimo entre la primera y segunda dosis es de 6 meses calendario. Se requieren 2 dosis para todos los grados de Preescolar al grado 12.

**COVID-19:** La vacuna COVID-19 se recomienda para todos los estudiantes de cinco años de edad o mayores según los CDC y la Autorización de uso de emergencia de la FDA. **Revisión requerida después de la aprobación total de la FDA.**